

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО БЕШЕНСТВУ В РСО – АЛАНИЯ

А.П. Бутаев, Л.У. Тедеева

Управление Роспотребнадзора по Республике
Северная Осетия-Алания
ГБОУ ВПО СОГМА Минздравсоцразвития России,
г. Владикавказ. Кафедра общественного здоровья,
здравоохранения и гигиены МПФ
(зав. кафедрой, д.м.н. – Бутаев Т.М.)
E-mail: ses@osetia.ru

Бешенство – вирусная зоонозная инфекция, передающаяся через укусы и слюну плотоядных, сопровождающаяся дегенерацией нейронов головного и спинного мозга. Характерны симптомы глубокого расстройства нервной системы: возбужденность, агрессивность, деменция, приводящая к параличу и летальному исходу.

За период 2007 – 2011 годы эпизоотическая ситуация по бешенству в РСО – Алания оставалась нестабильной. Максимальное число очагов на территории РСО – Алания отмечалось в 2009 году. В связи с создавшейся напряженной эпизоотологической и эпидемиологической обстановкой по бешенству в республике Управлением Роспотребнадзора по РСО – Алания было инициировано обсуждение первоочередных мер профилактики инфекции на заседании Совета экономической и общественной безопасности РСО – Алания. Созданная 9.02.2010 г. межведомственная группа провела дополнительное изучение указанной проблемы. Результаты работы доведены до всех заинтересованных ведомств, АМС. Итогом работы стало принятие республиканской программы «Республиканская целевая программа по профилактике бешенства на 2012 – 2014 годы» с объемом финансирования на сумму 36367,91 руб., утвержденная Постановлением Правительства РСО – Алания от 14.06.2011 г. №154

Таблица №1

Динамика регистрации эпизоотических очагов за 10 лет

Годы:	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Очаги	86	98	78	59	38	37	37	66	34	24

Эпизоотическое неблагополучие по бешенству отмечалось на территории всех административных районов республики.

Таблица №2

Очаги бешенства по районам РСО – Алания за 2007–2011 гг.

Районы:	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Итого:	Удельный вес
г. Владикавказ	4	8	10	5	3	30	15,1
Алагирский район	3	2	2	2	1	10	5,1
Ардонский район	-	-	4	-	4	8	4,0
Дигорский район	2	3	3	1	3	12	6,0
Ирафский район	6	3	1	2	1	13	6,6
Кировский район	2	-	5	-	-	7	3,5
Моздокский район	5	-	5	4	2	16	8,1
Правобережный район	5	14	28	8	4	59	29,8
Пригородный район	10	7	8	12	6	43	21,7
Итого:	37	37	66	34	24	198	

Отмечается снижение числа обратившихся по поводу укусов в 2011 году в сравнении с 2007 годом – на 8,5 %, среди детей – на 20,7 %. Показатель обращаемости составил – 538,8; против 588,6 на 100 тыс. населения, среди детей – 177,4, против – 193,2.

По-прежнему не в полном объеме проводится профилактическая вакцинация лиц, профессиональная деятельность которых связана с риском инфицирования вирусом бешенства, из – за недостаточного количества антирабических препаратов:

- в 2007 году – 42 чел. (14,3 %);
- в 2008 году – 113 чел. (46,7 %);
- в 2009 году – 98 чел. (30,6 %);
- в 2010 году – 137 чел. (63,1 %);
- в 2011 году – 140 чел. (40,7%)

В 2011 г. обновлены и утверждены «Соглашение о взаимодействии Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РСО – Алания, Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РСО – Алания, Управления ветеринарии РСО – Алания, Комитета жилищно – коммунального хозяйства Республики Северная Осетия – Алания, Министерства здравоохранения РСО – Алания по вопросам профилактики болезней общих для человека и животных» и «Комплексный план мероприятий по предупреждению заболеваемости бешенством животных и людей в республике Северная Осетия – Алания».

УДК:16.12-008.331+618.173

ПСИХИЧЕСКАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

В.А. Гадиева

УРАН, Институт биомедицинских исследований ВНЦ РАН,
г. Владикавказ.

ГБОУ ВПО СОГМА Минздравсоцразвития России,
г. Владикавказ. Кафедра патофизиологии (зав.кафедрой проф.
д.м.н. Хетагурова Л.Г.)

Gadievava1976@mail.ru

Под понятием «социальная дезадаптация женщин в постменопаузе» понимают сочетание когнитивных (в частности внимание и память) и эмоциональных (самооценка, самочувствие, активность, модальность настроения) показателей, характеризующих состояние психической сферы женщин на данном возрастном этапе и определяющих качество их жизни.