

ВЛИЯНИЕ ИАПФ ФОЗИНОПРИЛА НА ГЕМОДИНАМИКУ МАЛОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ИБС В СОЧЕТАНИИ С СД II ТИПА

С.А. Газзаева

ГБОУ ВПО СОГМА Минздравсоцразвития России,
г. Владикавказ.

Кафедра госпитальной терапии с курсом ЛФК и ВК
(зав.кафедрой – д.м.н., проф. Астахова З.Т.).

E-mail:gazzaev.kostya@mail.ru

В структуре ишемической болезни сердца (ИБС) безболе-
вая ишемия миокарда (БИМ) занимает важное место, а у боль-
ных ИБС в сочетании с сахарным диабетом (СД) распростра-
ненность БИМ встречается в 60-80% случаев. Такое сочетание
ИБС и СД взаимоотношают друг друга, что приводит к ранней
инвалидизации и смерти.

Цель: изучить возможность применения ингибитора анги-
отензинпревращающего фермента (ИАПФ) фозиноприла с це-
лью коррекции функционального состояния сердца у больных
БИМ в сочетании с СД 2 типа.

Материалы и методы: проведено общеклиническое,
электрокардиографическое (ЭКГ) и эхокардиографическое
(ЭхоКГ) исследования у 50 больных, страдающих БИМ в со-
четании с СД 2 типа. У всех больных основное заболевание
осложнилось хронической сердечной недостаточностью II-III
функционального класса по классификации NYHA с исходной
фракцией выброса левого желудочка менее 47%.

Среди обследованных было 22 мужчины и 28 женщин.
Средний возраст составил $51,7 \pm 2,7$ лет. Больные были разде-
лены на 2 группы, сопоставимые по полу и возрасту: 29 чело-
век (1 группа) получали стандартную комплексную терапию,
21 (2 группа) в лечебный комплекс был включен ИАПФ фози-

ноприл в дозе 10-20 мг методом титрования. Лечение проводилось в течение 2-х месяцев.

Результаты: через два месяца лечения отмечена положительная динамика в обеих группах – у 44 человек (88%) отмечено уменьшение клинических проявлений болезни (отеки, одышка, сердцебиение, слабость). Произошло достоверное улучшение показателей фракции выброса(ФВ) левого желудочка (ЛЖ), снизилось ОПСС, достоверно уменьшилось давление в легочной артерии, отмечена положительная динамика показателей диастолической функции ЛЖ. Однако, во второй группе по сравнению с первой отмечено достоверное повышение фракции выброса (на 16%), ударного объема, выраженность положительных сдвигов параметров легочной гемодинамики.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности более широкого использования ИАПФ фозиноприла у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с сахарным диабетом. Включение в лечебный комплекс данной категории больных способствует уменьшению выраженности клинических проявлений, оказывая положительное влияние на гемодинамику малого круга кровообращения.

УДК: 616.28-008.14

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ БОЛЬНЫХ СО СМЕШАННОЙ ФОРМОЙ ТУГОУХОСТИ

И.В. Гамаонова

ГБОУ ВПО СОГМА Минздравсоцразвития России,
г. Владикавказ. Кафедра оториноларингологии с офтальмологией
(зав.кафедрой – д.м.н. Гаппоева Э.Т.)

Сенсоневральная тугоухость– полиэтиологическое заболевание поражающее практически все слои населения заметно «помолодело» и относится к заболеваниям всех веков и цивили-